

В диссертационный совет 6D.KOA-011 при Государственном учреждении «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Отзыв

на автореферат диссертационной работы Меликоевой Сочиды Амиралиевны на тему: «Медико-социальные аспекты здоровья женщин, переживших акушерские кровотечения», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01.- акушерство и гинекология.

Актуальность выполненной работы. несомненна, поскольку лидирующее положение акушерских кровотечений в структуре материнской смертности диктует необходимость принятия решений для профилактики этого осложнения странами [Eimer G., O'Milley, Popivanov P., 2016, Sujata P., Janmeiaya S., Rajkumari P., Jangadhar S. 2016]. Установлено, что в развивающихся странах в структуре причин АК в последние годы, все же до сих пор имеет место более высокий риск развития гипотонических кровотечений и материнской смертности от кровотечений по сравнению с развитыми странами [WitteveenT., KoningJ., BezstarostH. 2016].

К сожалению, не всегда удается установить причину развития послеродового кровотечения, когда у женщин, с гладким течением беременности и родов вдруг в послеродовом периоде развивается гипотония и атония матки [Расулова Т., 2017; Давлятова Г.К., Камилова М.Я., Рахматуллаева Д.М., 2018;].

Частота критических гипотонических послеродовых кровотечений является наиболее достоверным показателем качества помощи матерям в стационарах, так как позволяет косвенно судить об организации работы, о знании национальных стандартов и командном подходе при оказании помощи пациенткам [Кулаков А.В, Шифман Е.М. 2016;]. Повышение качества медицинской помощи женщинам в родах для профилактики и лечения ПРК — важнейший шаг к достижению целей развития, сформулированных в «Декларации тысячелетия» ООН.

В связи с этим, научный интерес представляют исследования, посвященные изучению факторов, приводящих к развитию АК.

В настоящее время за период социально-экономических преобразований в странах, недостаточно работ, касающихся изучения региональных особенностей динамики изменения показателей АК и МС от них; недостаточно изучены медико-социальные и медико-организационные аспекты акушерских кровотечений; имеются единичные работы по оценке

качества акушерских ус луг указанной категории пациенток. Вышеуказанное определило выбор настоящего исследования и решить поставленные задачи.

Цель исследования соответствует названию диссертации и позволяет решить оставленные 4 задачи, конкретно отражающие все этапы работы

Автореферат представлен на 23 страницах компьютерного текста. Во **«Введении»** показана актуальность темы исследования и степень её изученности, определены объект, цель, задачи исследования, показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Цель и задачи сформулированы четко, выводы и практические рекомендации раскрывают суть проведенного исследования.

По тематике, проведен подробный анализ отечественной и зарубежной литературы. Исходя из анализа данных литературы по изучаемой проблеме, диссидентом определен ряд вопросов и обоснована актуальность работы для дальнейшего изучения выбранной темы.

Объект и предмет исследования определены правильно. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе проанализированы ежегодочные статистические сборники Национального Центра медицинской статистики МЗСЗРТ и годовые отчеты клиники ГУ НИИ АГиП за пятилетний период (2014 -2018 годы). На втором - ретроспективный анализ 255 случаев АК среди «едва выживших» женщин. Основную группу (I) составили 161 пациенток с ПК, группами сравнения (II) явились 61 женщина с ПОНРП и 33 беременные с ПП(III). На третьем этапе проведено интервьюирование и комплексное клинико-лабораторное обследование 40 пациенток, перенесших АК.

Достоверность результатов исследования подтверждается теоретическим и методологическим подходом проведения клинических исследований, достаточным количеством обследованных больных, результатами объективных клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования. **Статистическая обработка** материала проводилась с использованием современных компьютерных технологий.

Судя по автореферату, диссертационное исследование отличается элементами **новизны и отражает запросы практики**. Диссидент смог провести и научно обосновать выявленные, упущеные возможности при оказании медицинской помощи женщинам, пережившим АК: ненадлежащий уровень антенатального ухода, недостаточная профессиональная подготовка специалистов по оказанию НАП, отсутствие «маршрутизации» для беременных, рожениц, родильниц и задержка госпитализации в

учреждения третьего уровня, ненадлежащий послеродовый уход в стационаре, неправильная тактика инфузионно-трансфузионной терапии. Научно обосновано использование методики аудита «neasmis» как дополнительного резерва по снижению АК, материнской заболеваемости и смертности.

Основные положения выносимые на защиту актуальны: послеродовые кровотечения являются лидирующими в структуре акушерских кровотечений, высокая частота развития акушерских кровотечений и связанная с ними материнская заболеваемость обусловлена комплексом факторов риска, упущенными возможностями при развитии акушерских кровотечений являются: ненадлежащее дородовое наблюдение, несоблюдение региональных клинических протоколов, недостатки послеродового ухода, конфиденциальное расследование случаев акушерских кровотечений среди «едва выживших» женщин является дополнительным инструментом оценки качества акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях

Подтверждено, что проведение конфиденциального расследования среди женщин, перенесших АК, является дополнительным резервом снижения материнской заболеваемости и смертности.

Работа имеет существенное **научно-практическое значение**, так как посвящена комплексному исследованию, которое установила высокую частоту развития АК и связанную с ними материнскую заболеваемость и смертность. Полученные результаты позволили выявить комплекс факторов риска развития АК, основные из которых связаны с низким уровнем информированности женщин, медико-социальной отягощенностью, высокой частотой экстрагенитальной патологии. Выявленные упущенные возможности оказания медицинской помощи при акушерских кровотечениях позволили разработать предложения по профилактике этого осложнения на амбулаторном и стационарном уровне, что позволит снизить материнскую заболеваемость и смертность

Представленные в диссертации теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации могут быть включены в программу практических и лекционных занятий кафедр акушерства и гинекологии по выявлению факторов риска развития акушерских кровотечений, методам временной остановки кровотечений, навыкам консультирования и послеродового наблюдения.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 6 статей в рецензируемых журналах ВАК РТ., разработано 1 учебно-методическое пособие.

Автореферат написан доходчиво; грамотно и аккуратно оформлен.

Работа Маликоевой С.А. выполнена на высоком научном уровне. Приведенные результаты можно классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое практическое и научное значение. Исследовательская работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на достаточном научном уровне

Диссертация соответствует требованиям п.163, гл.10 «Положения о диссертационных советах», утвержденного Постановлением Правительства РТ от 26.11.2016г. №505 и может быть представлена к публичной защите, а автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата медицинских наук по указанной специальности 14.01.01.-акушерство и гинекология.

Зав.кафедрой акушерства и гинекологии №2

ТГМУ им. Абу али ибни Сино,


доктор медицинских наук, профессор



Абдурахманова Ф.М.

Подпись Абдурахмановой Ф.М. заверяю

Начальник ОК:



Расулов М.Н

Подписанты отзыва, согласен на включение персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку

Контактные данные: г. Душанбе, тел.. Адрес электронной почты и адрес учреждения: 734024, Таджикистан, г. Душанбе.

